

Communiqué de presse du 22 mars 2012

Après une césarienne la voie basse est le mode d'accouchement comportant le moins de risques

L'association Césarine, dédiée depuis 2005 à l'échange, au soutien et à l'information autour de la naissance par césarienne, fait appel à la plus grande prudence et **souhaite prévenir une mauvaise interprétation de l'étude australienne¹** publiée dans la revue scientifique américaine PloS ONE (Public Library of Science) et relayée par l'Agence France Presse et le Figaro les 13 et 14 mars 2012.

En effet certains biais existent dans le traitement statistique des participants puisqu'une très petite partie a été randomisée (22 femmes sur 2323), le choix du mode d'accouchement étant laissé à certaines participantes. De plus une partie des résultats attribués aux accouchements par voie basse après césarienne sont faussés dans la mesure où certaines des participantes affectées à ce groupe ont finalement accouché par césarienne itérative dont certaines en urgence (ce qui augmente le risque hémorragique).

L'information majeure de l'étude fait état d'un risque de décès ou de complications graves pour l'enfant lors d'un accouchement par voie basse après césarienne. Il est essentiel de noter que **les 2 décès rapportés dans l'étude demeurent inexpliqués** donc potentiellement non liés au mode d'accouchement.

Par ailleurs **l'étude ne met pas en perspective les effets sur le long terme de la césarienne** (risques accrus de placenta prævia et accreta notamment²).

Dès lors l'association Césarine rappelle que la pratique systématique d'une césarienne sur utérus cicatriciel, sans autre indication médicale que la présence d'une cicatrice utérine, n'a plus raison d'être et n'est plus admissible aujourd'hui³. **En effet, la césarienne itérative augmente la mortalité et la morbidité maternelle sans améliorer la sécurité néonatale⁴**. Pour autant elle n'évite pas complètement les déhiscences et les ruptures utérines (ces dernières restent rares dans l'absolu).

Association Césarine

Contact presse Césarine

Courriel : presse@cesarine.org

Portable : 06 70 46 60 93

www.cesarine.org

¹ Caroline A. Crowther, Jodie M. Dodd, Janet E. Hiller, Ross R. Haslam, Jeffrey S. Robinson, on behalf of the Birth After Caesarean Study Group « *Planned Vaginal Birth or Elective Repeat Caesarean : Patient Preference Restricted Cohort with Nested Randomised Trial* ».

² Marshall NE, Fu R, Guise J-M. « *Impact of multiple cesarean deliveries on maternal morbidity: a systematic review* ».

³ Voir les Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC) « *Césarienne : conséquences et indications* » du CNGOF

⁴ Intervention de Philippe Boisselier pour les Deuxièmes Journées d'Obstétrique du Collège de Gynécologie de BORDEAUX et du Sud-Ouest (Bordeaux, 18/11/1995) « *Indications de la césarienne itérative sur utérus cicatriciel* ».